

Bullettino della Società Entomologica Italiana
Anno XXXIII - 1901 - pag. 57-59.

Spicilegio mitmeologico
di C. Emery.

Spicilegio myrmecologico
di C. Emery.

Formiche

raccolte in Cefalonia, dal Dott. Domenico Langiorgi.

Stenamma (Aphaenogaster) testaceo-pilosum var. *balkanica* Emery.

S. (A.) Langiorgii n. sp.

S. (Messor) barbarum meridionale Cr. Andre'.

Pheidole pallidula Nyl.

Crematogaster scutellaris subsp. *Schmidti* Mayr.

C. sordidula var. *Flachi* For.

Acantholepis Frauentfeldi Mayr, tipo e var. *nigra* Emery.

Lasius emarginatus Latr.

L. brunceus Latr.

L. flavus L.

L. mixtus Nyl.

Formica fusca L.

Camponotus maculatus aethiops Latr., var. *concaua* For.

C. maculatus samius For., var. *ionica* n. var.

C. vagus Scop.

C. lateralis Ol.

C. truncatus Lun.

C. Hiesemöetheri Pog.

Stenamma (Aphaen) Sangiorgii, n. sp.

♀: Giallo-fulvo, lucida, margine delle mandibole e vertici
brunici, zampe pallide, peli obliqui lunghi e fini, copiosi

- 58 -

sul capo, sulla maggior parte del torace e sul gastro,
scarsi sull'epinoto, sul periotto e sul postperiotto; epinoto,
periotto e postperiotto sono coperti da una pubescenza densa, vel-
lutata, obliquamente eretta, una pubescenza egualmente
densa, ma più obliqua copre le antenne e le zampe, le qua-
li non hanno peli setolosi. Capo poco più lungo che largo,
più stretto d'innanzi che di dietro, col margine posteriore
quasi diritto nel mezzo; gli angoli arrotondati; la sua su-
perficie è levigata con minuti punti piliferi e con deboli rughe
longitudinali nella metà anteriore. Clypeo debolmente



S. (A.) Sangiorgii ♀

convesso, col margine anteriore alquanto sinuato nel mezzo, liscio nella parte mediana, rugoso lateralmente, Mandibole striate, col margine masticatorio armato di 10-11 denti progressivamente più piccoli dall'apice alla base e fra i quali si scorgono vestigia di denti più minuti; margine basale della mandibola denticolato. Lamine frontali poco elevate; nel mezzo della fronte si vede una carena longitudinale ottusa, che cessa bruscamente poco prima dell'occhio mediano. Lo scape raggiunge l'occipite, gli artioli del funicolo sono più lunghi che grossi, i 4 ultimi formano una clava poco ingrossata. Il torace è levigato e lucidissimo, con minuti punti piligeri; è notevole l'epinoto molto disteso che, invece di spine, porta grossi processi ottusi ed è coperto della peluria vellutata che è descritta sopra. Il pettiolo porta un nodo squamiforme con margine ritondato; il postpettiolo è poco più largo del pe-

- 59 -

tiolo ed è ritondato, poco più largo che lungo. Le zampe sono piuttosto sottili, ma non lunghe, i femori non più grossi delle tibiae, le tibiae posteriori con speroni sottili. Le ali sono ialine con venatura gialla, la venatura disposta come di solito nel sottogenere *Aphaenogaster*. Lunghezza 7 mm.

Specie molto ben distinta per la forma dell'epinoto e per la pubescenza. Ne ho veduto un solo esemplare.

Camponotus maculatus samius For. var. *ionia* n. var.

♀. Scultura e pubescenza come nella forma tipica di *Lamo*, dalla quale si distingue pel colore. Corpo nero, con le zampe bruno scuro, i trocanteri e l'estremità delle tibiae rosso-chiaro, il funicolo delle antenne ferrugineo-chiaro, l'estremità delle mandibole più o meno rossiccia.

3 esemplari. -

Emery - Alcune formiche delle colonie critiche
Boll. Soc. Ent. Ital. 1901, pag. 59.

Leptogenys Bellii F. - Shundi
Stuhlmanni Meger - Shundi

Mon. bicaris Forel. - Shunde
salomonis

Crem. Menilecki v. *Alsteri* - Shunde

Crem. Chiracini - Sasti

Ph. Tenuiffens - Massana

Ph. Acbulii v. *erythraea* - Massana e Shunde

Ph. speculifera v. *ascensis* - Shunde

Ph. meger. punctulata - "

Tet. pygmaea - Massana

Acut. gracilis v. *carbonaria* - Sabar^{gama}~~gama~~

" *carbonaria* v. *obtus* - Sasti

Camp. somaliensis - Asmay

" *akwapimensis* - Kera, Asmay

" *carbo* v. *puberula* - Kera

" *Roberti* - Massana

from "Spicilegio Mimnecologico"